

شیوه نامه تهییه و جابجایی

## پیوندک از باغ مادری

مرتضی همتی<sup>۱</sup>، عبدالرضا کاوند<sup>۲</sup> و شکرالله حاجی وند<sup>۳</sup>

۱- محقق مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

۲- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

این شیوه نامه به منظور تهییه و جابجایی پیوندک از باغات مادری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### الف- امکانات لازم

شاخه پیوندک زنده، فعال و بسیار حساس در برابر شرایط محیطی است، لذا نیاز به امکانات و شرایط ویژه‌ای در حین برداشت، فرآوری و بسته‌بندی و عرضه به شرح زیر دارد.

۱- **دانش کارشناسی:** با هدف جلوگیری از هرگونه تداخل رقم و یا گسترش آلودگی، فرآیند تهییه پیوندک تحت مدیریت کارشناس باغبانی آشنا به رقم و مسلط به نقشه کشت باغ مادری انجام می‌گیرد.

۲- **سرد خانه:** محیطی بسته و بهداشتی با قابلیت کنترل دمای محیط حدود ۴-۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به مساحت لازم است که برای نگهداری حجم مناسبی از پیوندک در مدت زمان لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳- **اتاق یا انبار خنک:** اتاق خنک و بهداشتی برای فرآوری شاخه‌های پیوندی (برگ‌گیری، دسته‌بندی، بسته بندی، لیبل گذاری و ...) است که قبیل از انتقال شاخه پیوندک به سردخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴- **ظروف ضدغوضی:** تانک یا بشکه حامل محلول قارچ‌کش‌های عمومی (بنومیل، کاربندازیم، مانکوزب و ...) برای ضدغوضی بسته‌های شاخه پیوندک است.

۵- **یونولیت/یخدان:** جعبه عایق و مناسب که برای نگهداری پیوندک و ارسال آن به مناطق دور دست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Spring Belle  
دلو اسپرینگ بل

۶- **پوشش پیوندک:** پارچه کنفی/اگونی نگهدارنده رطوبت برای

پوشش دادن بسته‌های شاخه پیوندک برای نقل و انتقال به مسافت کم می‌باشد.

۷- **بازار برداشت پیوندک:** قیچی باغبانی تیز و برنده که بافت را تخریب نکند. لازم است قیچی قبل از برداشت شاخه پیوندی از هر درخت با مواد ضدغوضی کننده مؤثر(هیبیوکلریت سدیم یا واپتکس ۲۰ درصد حجمی) به دقت ضدغوضی شود. محلول ضدغوضی کننده بایستی هر روز کاری به صورت تازه تهییه شود.

۸- **اتیکت:** با توجه به اهمیت خلوص رقم و جلوگیری از هرگونه خطای انسانی و بروز اختلالات رقم باید قبل از شروع برداشت پیوندک، اتیکت‌های لازم به تعداد کافی تهییه شود. جنس اتیکت باید به نحوی انتخاب شود که در اثر تماس با رطوبت خراب نشده و اطلاعات آن (نام رقم، تاریخ) مخدوش نشود.

۹- **دفترچه یادداشت برداری:** برای ثبت و ضبط اطلاعات، شامل تعداد دسته‌های برداشت شده از هر درخت، کد شناسایی درخت، تاریخ برداشت، محل درخت در بلوک، نوع رقم و... که در دفتر باغ مادری نگهداری شده و سالانه نسخه‌ای از آن به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه خواهد شد.

ب- **برداشت و آماده سازی پیوندک**

۱- **فصل برداشت شاخه پیوندک:** شاخه پیوندک زمانی از درخت مادری برداشت می‌شود که از نظر فیزیولوژی رشد به مرحله بلوغ

شاخه پیوندک و جلوگیری از هر گونه تداخل فیزیکی پس از برگگیری بلافضلله شاخه‌های یک رقم برحسب طول و تعداد جوانه‌های قابل پیوند دسته‌بندی می‌شوند. شاخه‌ها بر اساس تعداد جوانه در هر شاخه، به دسته‌های (۱۵-۲۰-۲۵ چشمۀ جوانه) تفکیک و از محل (سر و ته) با استفاده از نخ کنفی بسته شوند.

۱۲- خدعاً غونی شاخه‌های پیوندی: با هدف پیشگیری از هر گونه الوگی سطحی، از یک نوع قارچ کش عمومی (کاربندازیم، بنومیل...) برای ازین بردن عوامل قارچی خارجی که پس از برداشت باعث فساد پذیری شاخه می‌شوند، استفاده می‌شود. لازم است دسته شاخه به روش غوطه‌وری در محلول قارچکش به غلظت ۱-۲ در هزار و به مدت ۲۰ ثانیه قرار گیرد.

۱۳- اتیکت گذاری: پس از بسته‌بندی، تک‌تک بسته‌ها اتیکت گذاری می‌شود. جنس اتیکت باید به گونه‌ای باشد که در اثر رطوبت ازین نرود و اطلاعات مندرج بر روی آن مخدوش نشود.

۱۴- انتقال بسته‌های پیوندک به سردهخانه: به منظور جلوگیری از تلفات آب از شاخه پیوندی، لازم است بلافضلله بعد از دسته‌بندی و ضدغونی، دسته‌های شاخه پیوندک به سردهخانه با دمای ۶-۴ درجه سانتیگراد انتقال یابند.

۱۵- آماده سازی برای انتقال: دسته‌های شاخه پیوندک برای انتقال ابتدا در پوشش کنفی پیچیده و برای مصرف تحويل متقارضی می‌گردند. حین انتقال باید پوشش مرطوب باشد و در مسافت‌های دور، استفاده از یخدان و یونولیت توصیه می‌گردد.

۱۶- ثبت و ضبط آمار پیوندک: با توجه به اهمیت مستندسازی در تولید و فروش مواد تکثیری گواهی شده، لازم است در مدیریت باغ مادری امکاناتی نظیر دفتر ثبت آمار به صورت فیزیکی و همچنین الکترونیکی فراهم باشد تا کارشناس باغ‌سادری بتواند آمار پیوندک تولید شده و یا فروخته شده را بر اساس تعداد چشمۀ جوانه پیوندک، ثبت و ضبط نماید.

۱۷- درخواست اخذ پیوندک: تحويل پیوندک به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقارضی دریافت پیوندک براساس درخواست کتبی متقارضی از شرکت تولیدکننده انجام می‌پذیرد. متقارضی باید دقیقاً تعداد پیوندک و رقم مدنظر خود را اعلام نماید. تصویر درخواست‌ها در آرشیو باغ مادری ثبت و ضبط می‌گردد.

۱۸- شرکت تولیدکننده پیوندک (دارنده باغ مادری) باید ترجیحاً برحسب دریافت تقاضا اقدام به برداشت پیوندک از درختان مادری نماید تا از افت کیفیت جوانه‌ها در اثر ماندگاری جلوگیری شود.

۱۹- تحويل پیوندک در قالب فاكتور فروش: شرکت تولیدکننده پیوندک (دارنده باغ مادری) باید پیوندک‌ها را در قالب فاكتور فروش

رسیده باشد. بر جسته‌شدن جوانه‌ها، رنگ پوست ساقه و همچنین سهولت پوسته‌شدن جوانه‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های فیزیولوژیکی رسیدگی جوانه پیوندی می‌باشد. بسته به نوع محصول و منطقه غرفایی معمولًا شاخه پیوندک در پایان فصل بهار (برای پیوند جوانه) یا از اواسط تابستان (برای پیوند خواب) برداشت می‌شود.

۲- زمان تهیه شاخه پیوندک: بهترین زمان برای برداشت شاخه پیوندک در ساعات خنک روز (صبح زود و عصر نزدیک غروب آفتاب) می‌باشد.

۳- ضدغونی ابزار برداشت (قیچی باگبانی): قبل از شروع برداشت شاخه (پیوندک) باید ابزار کار کاملاً ضدغونی شود.

۴- روش برداشت شاخه پیوندی از درخت مادری: پس از اینکه شاخه پیوندی به رشد کافی رسید، با مدیریت کارشناس و بر اساس رعایت نقشه کاشت درختان هر رقم در هر بلوك برداشت شاخه صورت می‌گیرد.

۵- اتیکت گذاری بر روی شاخه‌های پیوندی: به منظور جلوگیری از اختلاط رقم و پیشگیری از هر گونه اشتباه انسانی، لازم است پس از برداشت شاخه پیوندی از هر درخت مادری، بلافضلله اتیکت گذاری انجام شود.

۶- ضدغونی مجدد: ضدغونی قیچی بطور مستقل برای هر درخت قبل از برداشت شاخه الزامی است و برای برداشت شاخه از درخت بعدی الزاماً باید تکرار شود.

۷- یادداشت برداری: تعداد شاخه‌های برداشت شده از هر درخت، کد شناسایی درخت، تاریخ برداشت، محل درخت در بلوك، نوع رقم و... در دفترچه یادداشت مدیر باغ مادری ثبت و ضبط می‌گردد.

۸- سبدهای جابجایی: شاخه‌های پیوندی برداشت شده از درختان مادری برای انتقال به بخش فراوری ترجیحاً دون سبد ویژه‌ای قرار داده شوند که امکان درج اطلاعات و مشخصات رقم و بلوك مادری و... را داشته باشند.

۹- انتقال شاخه برداشت شده به انبار خنک: پس از برداشت پیوندک و نصب اتیکت بر روی بسته‌ها، سبد شاخه‌ها باید برای آماده سازی و دسته‌بندی و بلافضلله بدون فوت وقت به انبار خنک انتقال یابند.

۱۰- برگ‌گیری و سرزنه شاخه: به منظور جلوگیری از تبخیر و تعرق آب از سطح برگ‌ها، بلافضلله بعد از انتقال شاخه‌ها به انبار خنک، برگ‌گیری و سرزنه صورت می‌گیرد. برگ‌گیری بدین صورت انجام می‌شود که برگ‌ها از ناحیه دمبرگ حذف می‌شوند، به طوری که نصف دمبرگ روی شاخه باقی بماند. نوک شاخه‌ها از محلی که جوانه‌ها بالغ نشده‌اند نیز قطع می‌شوند.

۱۱- دسته‌بندی شاخه‌های پیوندی: به منظور تسهیل در جابجایی

متقاضیان، آدرس آنها و رقم / ارقام عرضه شده به نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به طور رسمی اعلام نماید. این دستورالعمل به منظور مدیریت برداشت پیوندک از باغات مادری در دو بخش و ۲۲ بند تهیه شده و برای بهره‌برداری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

#### ب) نوشته

\* بدین مفهوم که برای تهیه یک لیتر (۱۰۰۰ میلی لیتر) محلول ضدغونی کننده بایستی از ۲۰۰ میلی لیتر واکس خانگی و ۸۰۰ میلی لیتر آب استفاده نمود.

رسمی و سربرگ‌دار با اطلاعات کامل به متقاضی تحويل نماید.

**۲۰-شناختنامه رقم (کاتالوگ رقم):** شرکت تولیدکننده پیوندک (دارنده باغ مادری) باید شناختنامه رقم / ارقام مورد تقاضا را به همراه پیوندک به متقاضی ارائه دهد.

**۲۱-ارائه پیوندک ارقام گرده زا:** با توجه به مکانیزم خود ناسازگاری و دگرگرده افتсанی در درختان میوه شرکت تولیدکننده پیوندک باید به تعداد کافی پیوندک رقم گرده‌زا نیز در اختیار متقاضی قرار بدهد.

**۲۲-آمار و اطلاعات:** شرکت تولیدکننده پیوندک (دارنده باغ مادری) به صورت هفتگی آمار پیوندک‌های تحويل شده را به تفکیک اسامی

